


MISE EN PLACE DE LA CONCILIATION MEDICAMENTEUSE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME DE REHABILITATION PRECOCE EN CHIRURGIE THORACIQUE



DACOSTA-NOBLE Eléonore¹, LOPES Sophie¹, TOTH Katalin¹
¹Service Pharmacie, Hôpital Marie-Lannelongue
 133 Avenue de la Résistance, 92350 Le Plessis-Robinson, France

Introduction : La réhabilitation précoce est un programme hospitalier de recherche (PHRC) en chirurgie thoracique et vasculaire pour améliorer le rétablissement des capacités physiques et psychiques des patients assurant ainsi un retour rapide à domicile. Nous avons décidé d'instaurer la conciliation médicamenteuse dans ce programme pour favoriser la transmission des informations entre les professionnels de santé en vue d'éviter les erreurs médicamenteuses et d'assurer une prise en charge optimale du patient. Les patients concernés subissent de lourdes opérations chirurgicales souvent douloureuses et se voient prescrire des morphiniques. La problématique principale est la délivrance des morphiniques pour une sortie d'hospitalisation le dimanche lorsque les officines sont fermées. En théorie, le retour à domicile devrait se faire à J3 post-opératoire, les patients inclus dans notre étude sont ceux opérés le mercredi après-midi ou le jeudi.

Matériels & méthode :



Résultats & discussion: Depuis Janvier 2016, 65% des patients (âge moyen = 60 ans, sexe ratio = 1,3 en faveur des hommes, durée moyenne de séjour = 5,8 jours) ont pu bénéficier de la conciliation médicamenteuse sur les 32 patients inclus dans le protocole. 72% des patients prenaient un traitement au long cours (Figure 1: *Classification ATC des traitements pris au long cours par les patients inclus*). Le nombre moyen de ligne de traitement d'entrée et de sortie étaient respectivement 3±3 versus 6±3 lignes. L'augmentation du nombre de lignes en sortie correspond à la prescription d'antalgiques post-opératoire (Figure 2 : *Classification ATC des traitements de sortie des patients inclus*). Sur nos 32 patients inclus dans le programme, seulement 4 (12%) étaient susceptibles de sortir le dimanche avec une prescription de morphiniques pour le traitement post-opératoire de la douleur. Pour ces patients la démarche est détaillée dans la Figure 3 : *Procédure de sortie du patient le dimanche sous morphiniques*.




Figure 1 : Classification ATC des traitements long cours des patient




Figure 2 : Classification ATC des traitements post-opératoire des patients inclus

Vendredi soir - Interne en pharmacie

Contacte la pharmacie de garde du secteur
 Se renseigne sur la disponibilité du traitement morphinique prescrit en accord avec la prescription du pneumologue
 Etablit une fiche de liaison hôpital/ville
 Fax de la fiche de liaison à l'officine de garde (*Annexe 2: Exemple de fiche de liaison*)
 Se rend dans la chambre du patient pour lui signaler que son traitement a été transmis à la pharmacie de garde afin qu'il s'y rende le jour de sa sortie

Dimanche - Sortie du patient

Le patient sort avec son ordonnance de sortie contenant des morphiniques
 Il se rend à la pharmacie de garde pour se procurer son traitement
 Il n'y a aucune rupture dans la prise en charge de la douleur post-opératoire

Figure 3 : Procédure de sortie du patient le dimanche sous morphiniques

Médicament	Dosage	Voie	Posologie	Indication	Disponible à la pharmacie CHU	Commentaires/Alternatives si médicament non disponible

Annexe 1 : Fiche d'historique médicamenteux

FAX

De : Katalin TOTH, Pharmacien Chef
 Centre Chirurgial Marie Lannelongue
 133, Avenue de la Résistance
 92350 Le Plessis Robinson

Madame X - Pharmacie Y
 92370 Chateaufort, Malakoff
 Tel : 01 46 00 17 22
 Fax : 01 46 00 17 22
 E-mail : k.toth@snphpu.fr

Date : 01/04/2016
 Objet : Fiche de liaison Hôpital-Ville

Madame,
 Comme convenu lors de notre échange téléphonique, Monsieur X est patient inclus dans le protocole de réhabilitation précoce à l'Hôpital Marie Lannelongue, sortie Dimanche 03/04/2016 et, votre recherche son traitement dans votre officine.

Son traitement comprendra les médicaments suivants :

- Préferidol 50mg
- Indométh 50mg granulés pour suspension buvable
- Artéliorane 10mg
- Délorane 300mg gélules

Bien cordialement

Eléonore Decoste-Noble
 Médecin en Pharmacie
 01 40 94 87 39

P/O
 Katalin TOTH
 Pharmacien Chef

Centre Chirurgial Marie Lannelongue - 133, Avenue de la Résistance 92350 LE PLESSIS ROBINSON - Tel : 01 46 00 17 22

Annexe 2: Exemple de fiche de liaison

Conclusion: La conciliation médicamenteuse en chirurgie avec une durée moyenne de séjour courte implique une forte coordination pluridisciplinaire. L'équipe médicale est d'ores et déjà satisfaite de cette nouvelle activité de pharmacie clinique. Sa mise en œuvre leur semble indispensable pour assurer la continuité du traitement, notamment celui des morphiniques. D'autant plus que la probabilité de sortie des patients le dimanche va augmenter avec la diminution de DMS envisagée par le PHRC de la réhabilitation précoce.